



- Inicio
- Quiénes somos
- FACTORES DE RIESGO
 - Hipertensión arterial
 - Diabetes
 - Fibrilación auricular
 - Colesterol alto
 - Sedentarismo
 - Dieta inadecuada
 - Alcohol
 - Obesidad
 - Tabaquismo
 - Estrés y depresión
- RECURSOS
 - Vídeos
 - Blog
 - Podcast
 - Enlaces de utilidad
 - Lecturas adicionales
 - Publicaciones en los medios

- Noticias
-  Español
 -  English
 -  Português
 -  Русский
 -  Español
 -  Français
 -  Polski

▪ CONTACTO

DONATE

Podcast #5 - Fibrilación auricular e ictus



La fibrilación auricular (FA) es un ritmo cardíaco irregular que se caracteriza por un latido rápido e irregular. Se estima que aumenta el riesgo de ictus entre tres y cinco veces, y que está asociada a alrededor de una cuarta parte de todos los ictus isquémicos. Además, la FA está asociada a ictus más graves que provocan una mortalidad y una discapacidad mayores. Hemos hablado de este tema con la

doctora Anita Arsovska, Clínica Universitaria de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad «Ss Cyril and Methodius», Skopje, Macedonia del Norte, FESO y miembro del consejo de SAFE.

Desarrollado por



SAFE se reserva el pleno control sobre el contenido de este sitio web.

Con el apoyo de una beca formativa de



Enlaces

- [Condiciones de uso](#)
- [Política de privacidad](#)
- [Política de cookies](#)
- [Contacto](#)

- [Facebook](#)
- [X](#)
- [RSS](#)